


MISOTROL

+56982516985



Original

INFORMACIÓN

ENTRE LOS EFECTOS SECUNDARIOS MAS COMUNES FIGURAN NAUSEAS, VÓMITOS Y DIARREA DESPUES DE TOMAR EL MISOPROSTOL EXPERIMENTAS COLICOS UTERINOSY SANGRADO VAGINAL A MEDIDA QUE SE EXPULSA EL TEJIDO DEL EMBARAZO.

El dolor puede durar unos días a 2 semnass para sobrellevar el malestar o inflamación se les recomienda ingerir ibuprofeno 600 mg

El sangrado vainas puede ser ligero hasta 4 semnas (Su periodo normal puede regresar en tre 4 a 6 semnas

COMO SABER SI FUNCIONO


Es necesario esperar un tiempo y lugo realizar una ecografia , las pruebas de embarazo casera suelen no ser confiables

SINTOMAS

Dolor abdominal agudos tipo cólico, lumbago, dolores similares a una menstruación muy fuerte. Se EXPULSA material tisular o en forma de coágulos

SEÑALES QUE EL MISOPROSTOL NO FUNCIONO

sangrado escaso, falta de expulsión de coágulos, persistencia de síntomas de embarazo



VENTA

El producto se entrega presencial en estación de metro a convenir Momento en que se da para conversar las dudas y explicar la forma de uso del producto además de tener la oportunidad de revisar la fecha y verificar la originalidad

